



ANALGÉSICOS ANTIINFLAMATORIOS



Ibutil® Forte

Ibuprofeno + Tiocolchicósido
600mg/8mg - 10 Comprimidos Recubiertos

Indicación terapéutica

Tratamiento del dolor leve a moderado que cursa con contractura de la musculatura estriada.

Tractil®

Tiocolchicósido
4mg - 12 Comprimidos

Indicaciones terapéuticas

-Tratamiento coadyuvante de las contracturas dolorosas de la musculatura estriada



Tractil® Forte

Tiocolchicósido
8mg - 10 Comprimidos

Indicaciones terapéuticas

-Tratamiento coadyuvante de las contracturas dolorosas de la musculatura estriada.





ANTIBIÓTICOS

Amikacina

500mg/2mL - 1 Ampolla

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la amikacina.



Bacitracina

Ungüento - 15g

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de infecciones superficiales de la piel causada por gérmenes sensibles a la bacitracina.

Bactron®

Trimetoprim Sulfametoxazol
40 mg -200 mg / 5 mL Suspensión - 1 Frasco de 100 mL
80 mg -400 mg -20 Tabletas

Bactron® Forte

Trimetoprim Sulfametoxazol
160 mg -800 mg - 10 Tabletas

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de las infecciones producidas por gérmenes sensibles al sulfametoxazol y la trimetoprima.




Gratio®

Ciprofloxacina
500mg y 750mg - 10 Tabletas Recubiertas

Indicaciones terapéuticas

Adultos

- Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles al ciprofloxacino.
- Tratamiento de infecciones no complicadas del tracto respiratorio alto.
- Tratamiento de infecciones no complicadas del tracto urinario bajo.
- Tratamiento de la gonorrea.
- Tratamiento de la diarrea del viajero.
- Prevención y tratamiento de infecciones postexposición vía inhalatoria a Bacillus anthracis (Ántrax).



ANTIGOTOSO

Aluron®

Alopurinol
100mg - 30 Tabletas
300mg - 20 Comprimidos

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de la hiperuricemia primaria y secundaria. Gota. Nefropatía aguda por ácido úrico.
- Coadyuvante en el tratamiento con citostáticos o con drogas que provoquen hiperuricemia



CARDIOMETABÓLICA



Algoren®

Clorhidrato de Propanolol
10mg - 20 Tabletas
40mg - 20 Tabletas

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de la hipertensión arterial, taquiritmias supraventriculares.
- Profilaxis del Angor Pectoris (Angina de pecho)

Artenolol®

Atenolol
100mg - 30 Tabletas

Indicaciones terapéuticas

- Hipertensión arterial.
- Angina de pecho.



Flavol®

Trihidroxietilrutina
300mg - 20 Cápsulas

Indicaciones terapéuticas

- Prevención y tratamiento de la fragilidad capilar.
- Tratamiento de las varices en sus diversos grados. Tromboflebitis, flebotrombosis y varicoflebitis. Hemorroides.
- Ulceras varicosas y edema de estasis.
- Coadyuvante en el tratamiento de las escaras y hematomas.
- Prevención de hemorragias.
- Refuerza la resistencia vascular en la hipertensión arterial.



CARDIOMETABÓLICA



Glucozim®

Metformina

500mg - 30 Comprimidos

850mg - 30 Comprimidos

1000mg - 30 Comprimidos

500mg - 20 Comprimidos

Indicaciones terapéuticas

- Control de la glicemia en pacientes diabéticos tipo II con o sin obesidad.
- Control de la glicemia en niños mayores de 12 años y adolescentes con diabetes tipo II con o sin obesidad, y que el control con dieta y ejercicio no son suficientes para el control de la glicemia.
- En asociación con insulina para el tratamiento de pacientes diabético tipo II cuyo control metabólico no se logra con la terapia convencional.

Metsiglin®

Metformina + Sitagliptina


500mg/50mg - 30 Comprimidos Recubiertos

500mg/50mg - 10 Comprimidos Recubiertos

Indicación terapéutica

- Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, en aquellos pacientes en los cuales la monoterapia no es efectiva.





CORTICOSTEROIDE

Decobel®

Dexametasona
0,5mg - 30 Tabletas
4mg - 10 Comprimidos
8mg/2mL - 1 Ampolla
8mg/2mL - 1 Vial

Indicaciones terapéuticas

- Afecciones inflamatorias, inmunológicas o alérgicas susceptibles de tratamiento con corticosteroides.
 - Prevención y tratamiento de las náuseas y los vómitos inducidos por quimioterapia.
 - Edema cerebral asociado a tumores cerebrales primarios o metastásicos.
- Tratamiento de shock debido a diversas causas.



RESPIRATORIO

Acetoben®

Guaifenesina
100mg/5mL en 120 mL - Jarabe
1 Envase con vaso dosificador

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de las afecciones respiratorias que cursen con dificultad para expulsar las secreciones bronquiales




SNC

Gabox®

Carbamazepina
200mg - 20 Comprimidos

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento único o asociado de las convulsiones tónico-clónicas generalizadas primarias y de las convulsiones parciales simples o complejas con o sin generalización secundaria
 - Tratamiento de la neuralgia del trigémino y de la neuralgia del glosofaríngeo.
- Tratamiento de la manía aguda resistente al tratamiento con litio como monoterapia o terapia coadyuvante.






GASTRO

Atrobel®

Hioscina N-butilbromuro
Solución oral gotas
10mg/mL - 15mL

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento del dolor abdominal tipo cólico de moderada a fuerte intensidad.



Colayte®

Electrolitos + Polietilenglicol 3350
69,57g [1 Sobre] - 4 sobres [Caja]

Indicaciones terapéuticas

- Limpieza intestinal previa a cualquier procedimiento clínico que requiera un intestino limpio, ejemplo: endoscopia o radiología intestinal.

Milax®

Polietilenglicol 3350
120g - 1 Envase
360g - 1 Envase
8,5g [1 Sobre] - 20 sobres [Caja]

Milax Solución®

Polietilenglicol 3350
120 mL - 1 Envase
180 mL - 1 Envase

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento sintomático del estreñimiento.



Ver guía de dosificación al final del portafolio.



Sarifan Compositum®


Hioscina N-butilbromuro + Dipirona
0.01g-0.25g - 20 tabletas

Indicación terapéutica

- Tratamiento del dolor abdominal tipo cólico de moderada a severa intensidad.



VITAMINAS Y SUPLEMENTOS



Folifer B-12®

Fumarato Ferroso + Ácido Fólico
+ Cianocobalamina [Vit. B12]
350mg + 0,350mg + 0,025g
30 Tabletas

Indicaciones terapéuticas

- Prevención y tratamiento de las anemias mixtas del embarazo. Anemias ferropénicas y megaloblásticas, deficiencia de vitamina B-12.

Rocarnin®

L-Carnitina
120mL- Solución oral (1 Frasco)
180mL- Solución oral (1 Frasco)

Indicaciones terapéuticas

- Deficiencia congénita de L-Carnitina.
- Deficiencia de L-Carnitina en pacientes sometidos a diálisis repetidas.
- Fibroelastosis endocárdica.



Sin Azúcar



Ronavit®

Vitaminas del Complejo B
3 Ampollas de 2 mL cada una
+ 3 Jeringas [administración I.M.]

1 Ampolla de 2 mL
+ 1 Jeringa [administración I.M.]

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de la deficiencia de vitamina B1, B6 y B12.

GUIA DE DOSIFICACIÓN **Milax**[®]

NIÑOS

	EDAD	CANTIDAD	FRECUENCIA
DOSIS DE DESIMPACTACIÓN [Dependiendo de la edad, se sugiere ajustar la dosis de 1 a 1,5g/Kg peso]	1 A 3 AÑOS	1 MEDIDA/SOBRE	2 VECES AL DÍA
	3 A 6 AÑOS	1 MEDIDA/SOBRE	3 VECES AL DÍA
	6 A 14 AÑOS	2 MEDIDAS/SOBRES	2 VECES AL DIA
	MAYORES DE 14 AÑOS	2 MEDIDAS/SOBRES	3 VECES AL DIA
DOSIS DE MANTENIMIENTO [Dependiendo de la edad, se sugiere ajustar la dosis de 0,6 a 0,9g/Kg peso]	1 A 3 AÑOS	1 MEDIDA/SOBRE	1 VEZ AL DÍA
	3 A 14 AÑOS	1 MEDIDA/SOBRE	2 VECES AL DÍA
	MAYORES DE 14 AÑOS	2 MEDIDAS/SOBRES	2 VECES AL DÍA

ADULTOS

	EDAD	CANTIDAD	FRECUENCIA
DOSIS DE DESIMPACTACIÓN	MAYORES A 18 AÑOS	2 MEDIDAS/SOBRES	3 VECES AL DÍA
DOSIS DE MANTENIMIENTO	MAYORES A 18 AÑOS	2 MEDIDAS/SOBRES	2 VECES AL DÍA
DOSIS DE SEGUIMIENTO	Para todos los casos: Ajustar hasta regularizar el tránsito intestinal, para llegar a la dosis ideal.		

Cada medida y/o sobre contienen 8,5g

Se recomienda disolver en medio vaso de líquido [120cc-4onz], la disolución se facilita en líquidos a temperatura ambiente e incluso caliente que no supere los 50° C a temperaturas frías menor a 18 °C requiere mayor esfuerzo para disolver.

Agite hasta disolver e ingiera inmediatamente la solución oralmente.

No aporta sabor, ni olor.

GUIA DE DOSIFICACIÓN **Milax**[®] SOLUCIÓN AL 50%

NIÑOS > 6 meses a 3 años

DOSIS DE DESIMPACTACIÓN	2 mL a 3 mL/Kg peso/día
DOSIS DE MANTENIMIENTO	1,5 mL a 2 mL/Kg peso/día

NIÑOS > 3 años a 14 años

DOSIS DE DESIMPACTACIÓN	17 mL - 3 veces al día
DOSIS DE MANTENIMIENTO	17 mL - 2 veces al día

Dosis: A juicio del facultativo.

Esta guía de dosificación es de uso exclusivo para médicos.

Se puede diluir en 30 cc - 60 cc (Equiv. 1 o 2 onzas) de líquido a temperatura ambiente que no supere los 50° C (Solo si se requiere).



70 años de salud y compromiso
DÍA A DÍA CONTIGO VENEZUELA
Mirando hacia el Futuro...



ronava_laboratorio
 Laboratorios Ronava
 ronava_laboratorio
 C.A. Productos Ronava
 www.ronava.com

